

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Clasificación toxicológica: CLASE II MODERADAMENTE PELIGROSO. (IPCS/OMS 2009)

Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros auxilios: En caso de ingestión: provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. Contacto con la piel: lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar. Contacto con los ojos: lavado a chorro con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT, TEL.: 1722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

Aves: Ligeramente tóxico

Peces: Muy tóxico

Abejas: Virtualmente no-tóxico.

Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas y organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.

Disposición final del envase: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforo el envase para evitar su reutilización.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, en lugar fresco, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para Agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, comestibles, raciones u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique CUIDADO. VENENO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS O VESTIMENTAS.

Nota: Este producto se elabora bajo estrictas normas de calidad. El registrante y/o vendedor no asumen responsabilidad alguna por daños o perjuicios derivados por el uso o el almacenaje de este producto, ya que los mismos escapan a su control directo.



HERBICIDA

TRIDENT 48 CE

Concentrado emulsionable

Ingrediente activo:	en peso:	en volumen:
Butoxietil ester de triclopyr	62%	667 g/L
Equivalente en triclopir	44.6 %	480 g/L

Grupo químico: Ácido piridiloxiacetico

Registro: N° 2352

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
USO AGRÍCOLA

Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Lote N°:

Fecha de fabricación:

Fecha de vencimiento:

Contenido neto: 5 Litros

Registrante: LANAFIL S.A.



Bvar. Artigas 420 Of.105/Montevideo
Tel.: 2710 1932/lanafil@lanafil.com/lanafil.com



NOCIVO

RECOMENDACIONES DE USO

Generalidades: TRIDENT 48 CE es un herbicida hormonal sistémico, absorbido rápidamente por el follaje y el sistema radicular, con traslocación a toda la planta, que se acumula en los tejidos meristemáticos. Su mecanismo de acción está dado por la inhibición de auxinas reguladoras del crecimiento encargadas de la elongación celular, (controlando malezas de hoja ancha) y no afecta el desarrollo de las gramíneas a las dosis normales de aplicación. Se puede usar para controlar malezas en pasturas de gramíneas, (praderas o campo natural) así como en cultivo de arroz, maíz y sorgo. También resulta adecuado para controlar malezas arbustivas (leñosas y semileñosas) y rebrotos en plantaciones forestales.

Instrucciones de uso:

CULTIVO	DOSIS	MODO Y MOMENTO DE APLICACIÓN	MALEZAS CONTROLADAS	
ARROZ	0.5 a 0.7 L/ha	Aplicar en post-emergencia del cultivo, cuando las plantas de arroz tengan 4 a 5 hojas hasta el comienzo del "encañado". Retirar el agua de la chacra antes del tratamiento, para permitir una buena cobertura de las malezas por tres a cuatro días. Después volver a regar.	Nombre común	Nombre científico
			Chirca Chirca blanca Lengua de vaca Carqueja Enredadera Ortiga Duraznillo	Eupatorium buniifolium Baccharis spicata Rumex pulcher Baccharis trimera Ipomoea grandifolia Urtica urens Cestrum parqui
MAÍZ Y SORGO	0.15 - 0.25 L/ha	Aplicar en post-emergencia del cultivo, cuando las plantas tengan 4 a 5 hojas.		
PRADERAS DE GRAMÍNEAS O CAMPO NATURAL	0.4 L/100L	Manchoneos: Realizar tratamientos dirigidos a las malezas. Retirar el ganado por 15 días.		
PLANTACIONES FORESTALES (control selectivo de especies leñosas y semileñosas)	Aplicación basal: 1 a 2L/100L de gasoil	Aplicar mediante pulverizadora a la base del tronco (hasta 0.4 a 1m. de altura).	Espinillo Acacia negra Eucaliptus Álamo Sauce Tala Zarzamora	Acacia caven Gleditsia triacanthos Eucaliptus spp. Populus spp. Salix spp. Celtis spp. Rubus fruticosus
	Aplicación a "tacones": 1.5 a 2L/100L de gasoil	Pulverizar la superficie del corte, enseguida de la tala.		
	Inyección directa: puro o diluido en agua (1:1)	Realizar un corte de 2 a 3 cm. de ancho alrededor del tronco y aplicar directamente con pincel en esa zona.		

Prevención de resistencia: Se recomienda rotar o combinar con otros herbicidas de diferentes mecanismos de acción, para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes. Se debe observar la presencia de malezas sin controlar, investigando la causa de su permanencia. Elimine las malezas sobrevivientes para evitar su propagación. Frecuencia de las aplicaciones: Una sola aplicación por temporada es suficiente. Contraindicaciones: Corrosivo al aluminio y al bronce. Es fitotóxico para todos los cultivos que no sean gramíneas. Extremar los cuidados para evitar la deriva hacia plantaciones sensibles. No aplicar con temperaturas superiores a 25 °C. Compatibilidades: Compatible con la mayoría de los productos normalmente usados en los cultivos indicados. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo. Tiempo de espera: Arroz, Maíz, Sorgo: 30 días. Praderas: No pastorear ganado por 21 días. Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas. Modo de preparación y técnica de aplicación: Se puede aplicar con equipos terrestres o aéreos, evitando la deriva hacia cultivos sensibles. Agregar la cantidad requerida de Trident 48 CE al tanque del equipo aplicador, ya cargando con agua y con el agitador en marcha. Usar boquillas de abanico plano logrando una cobertura de 20 a 40 gotas por centímetro cuadrado logrando una cobertura homogénea. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedarios. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

