

Dithialan 75 WDG

Fungicida

Gránulos Dispersables

Ingrediente activo:
DITIANON

en peso:
75 %

Grupo químico:
Quinona

LOTE Nº:

Registro Nº: 3839 - Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Uso agrícola - Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.

FECHA DE FABRICACIÓN:

REGISTRANTE: LANAFIL SA

FABRICANTE: JIANGXI HEYI
CHEMICAL Co. Ltd.

VENCIMIENTO:



LANAFIL®

ORIGEN: CHINA

CONTENIDO NETO:

1 Kg.

Juan C. Gómez 1492 Piso 1 Montevideo - Tel.: 2916 1932* - Fax: 2916 2404
lanafil@lanafil.com www.lanafil.com

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Generalidades: DITHIALAN 75 WDG es un fungicida de amplio espectro que actúa inhibiendo las enzimas responsables de la germinación de las esporas de los hongos patógenos. Frente a la sarna del manzano y del peral tiene acción curativa hasta 48 horas después de comenzado el período de infección.

Instrucciones de uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS Alto volumen (a punto de goteo)(*)	OBSERVACIONES
	Nombre Común	Nombre Científico		
MANZANO PERAL	Sarna	Venturia inaequalis Venturia pyrina	50 a 80 g / 100 L agua	Máximo de 2.0 kg./há
CITRUS	Sarna	Sphaceloma fawcetti	90 g / 100 L agua	Máximo de 2.0 kg./há en montes adultos.
DURAZNO	Podredumbre parda	Monilinia fructicola	70-100 g/100 L agua	Aplicar en floración.

(*) Cuando se utilicen equipos que arrojen menores volúmenes de agua por hectárea, se deberá ajustar la dosis en forma proporcional a la reducción de agua por há. manteniendo siempre la misma cantidad de producto por há.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Clasificación Toxicológica: Clase II PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO
(IPCS/OMS 2009)

Antídotos: No tiene.

Primeros auxilios: En caso de ingestión, provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. Contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con agua abundante. Contacto con los ojos, Lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación, retirar la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722.

CONCURRE AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLET O EL ENVASE.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

Aves: **Moderadamente tóxico.**

Peces: **Muy tóxico.**

Abejas: **Virtualmente no-tóxico**

No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, protegido de la luz solar directa, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para Agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, comestibles, raciones u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique: CUIDADO ☠ VENENO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS O VESTIMENTAS:

RECOMENDACIONES DE USO

Modo de preparación y técnica de aplicación: Es conveniente hacer una pre-dilución de la cantidad calculada de DITHIALAN 75 WDG en un balde con algo de agua, revolviendo hasta consistencia cremosa. Llenar el tanque del equipo de aplicación con agua hasta la mitad de su capacidad. Con el sistema de agitación en funcionamiento, agregar lentamente la pre-dilución y completar el volumen de agua necesario. Puede aplicarse con pulverizadores terrestres, tanto de alto volumen como de bajo volumen, asegurándose que logren una buena cobertura del cultivo a tratar. Prohibido llenar con agua las maquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana, suburbana, centros poblados y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

Frecuencia de las aplicaciones: Realizar tratamientos preventivos. **Manzanos y peral:** Comenzar "a punta verde" y continuar con aplicaciones semanales hasta que pase el peligro de infección primaria de sarna. **Citrus:** Aplicar a botón floral y a caída de pétalos.

Compatibilidades y fitotoxicidad: Puede ser mezclado con la mayoría de los productos autorizados en los cultivos indicados, salvo los de reacción fuertemente alcalina. No aplicar conjuntamente con aceites emulsionables. Dejar transcurrir una semana antes y/o después de la aplicación de DITHIALAN 75 WDG. En caso de duda, realizar una prueba previa a pequeña escala para probar su compatibilidad con otro fitosanitario, como así mismo su fito compatibilidad. Observar las recomendaciones de la etiqueta del producto con el cual se combine. Si dichas recomendaciones se contradicen con las establecidas en esta etiqueta, no efectuar la mezcla.

Tiempo de espera: Manzana, pera, durazno: **21 días** Citrus: **30 días**

Tiempo de reingreso al cultivo: No entrar al cultivo hasta que haya secado el depósito de producto aplicado. (mínimo 24 horas).

NOTA: Este producto se elabora bajo estrictas normas de calidad. El registrante y/o vendedor no asumen responsabilidad alguna por daños o perjuicios derivados por el uso o el almacenamiento de este producto, ya que los mismos escapan a su control directo.



NOCIVO



Y012012