

SEMSANA

Siembre semilla tratada con fungicida

COMPOSICIÓN g/L

Carbendazim	250
+ Thiram	100
+ Metalaxyl	50

Suspensión concentrada para el tratamiento de semillas de amplio espectro y con acción tanto sistémico como de contacto.

- Control de hongos patógenos de suelo y hongos sobre la semilla.
- Control sobre hongos superiores y Oomycetes, especialmente aquellos causantes del Damping-off o mal de almácigos (*Pythium sp.*, *Fusarium sp.*, *Rhizoctonia sp.*, *Phomopsis sp.*).

¿CUÁNDO SE USA?

Se utiliza una vez por ciclo de cultivo aplicándose a la semilla previo a la siembra. Es compatible para utilizar junto al inoculante (corroborar con la etiqueta del mismo).

DOSIS Y USOS REGISTRADOS

Soja (<i>Glycine max L.</i>)	200-250 (cc/100 kg semilla)
Alfalfa (<i>Medicago sativa L.</i>)	400-500 (cc/100 kg semilla)
Lotus (<i>Lotus corniculatus L.</i>)	400-500 (cc/100 kg semilla)
Trébol blanco (<i>Trifolium repens L.</i>)	400-500 (cc/100 kg semilla)
Trébol rojo (<i>Trifolium pratense L.</i>)	400-500 (cc/100 kg semilla)

OTROS USOS HABITUALES

Trigo y cebada (<i>Triticum aestivum L.</i> , <i>Hordeum vulgare L.</i>)	200-250 cc/100 kg
Maíz (<i>Zea mays L.</i>)	200-250 cc/100 kg
Festuca, Dactylis, Raigras (<i>Festuca arundinacea Schreb.</i> , <i>Dactylis glomerata L.</i> , <i>Lolium perenne L.</i>)	400-500 cc/100 kg

CONTROLA

- Mal de los almácigos (*Pythium spp.*, *Phytophthora spp.*, *Fusarium spp.*, *Rizoctonia spp.*)
- Tizón (*Cercospora kikuchii*)
- Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina*)
- Podredumbre de semilla (*Phomopsis spp.*)