



HERBICIDA

GLYFOSOL FULL 660 SL

Registro: N° 3670

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

USO AGRÍCOLA
PRODUCTO CORROSIVO AL HIERRO

Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.

Concentrado soluble

Ingrediente activo: Glifosato, sal potásica (equivalente en glifosato)	en peso: 48% 39%	en volumen: 660 g/L 540 g/L
---	-------------------------------	--

Grupo químico: Organofosforado

Grupo WSSA **9** HERBICIDA

Registrante: LANAFIL S.A.

Bvar. Artigas 420 Of.106/Montevideo

Lote N°: ver envase

Fecha de fabricación: ver envase

Fecha de vencimiento: ver envase

Tiempo de validez del producto (años): 2 años

Contenido neto: 20 Litros

Origen: China

Fabricante: Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd. Tel.: 2710 1932/lanafil@lanafil.com/lanafil.com

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Clasificación Toxicológica Aguda: CLASE III (tres) - LIGERAMENTE PELIGROSO (IPCS/OMS, 2019). **Antídotos:** No tiene antídoto. **Primeros Auxilios:** En caso de ingestión, enjuague la boca. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente dejando correr abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel, quite la ropa contaminada y lave la piel con agua. En caso de inhalación, retire a la persona del ambiente contaminado y llévele a un lugar bien ventilado. En todos los casos llame al CIAT. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT APORTANDO NOMBRE COMERCIAL O NUMERO DE REGISTRO, TELÉFONO 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. **Otras advertencias:** PROVOCA LESIONES OCULARES GRAVES. **Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:** Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados que hayan tenido contacto con el producto. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes de NITRILLO, botas, careta antiparras, máscara de tipo N100 con filtros de partículas y vapores orgánicos, y ropa adecuada (EPP) durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. **Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y polinizadores, lombrices:** A) Medidas generales. No producir deriva. No lavar ni vaciar equipos de aplicación en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagues naturales. En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Llamar a DINACEA, teléfono 29006136 int. 4600. La protección de los polinizadores es necesaria para la producción sostenible de alimentos. B) Peligrosidad del ingrediente activo. TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS; PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. TOXICIDAD PARA AVES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. TOXICIDAD PARA POLINIZADORES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. TOXICIDAD PARA ORGANISMOS DE SUELO (Lombrices): PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. PARA QUE EL GLIFOSATO SE DEGRADE INMEDIATAMENTE QUE LLEGUE AL SUELO, EL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA NO DEBE SER INFERIOR A 2%. C) Destino Ambiental: En base a sus evaluaciones no representa peligro para los distintos compartimentos ambientales. **Disposición final de envases:** Una vez vaciado el contenido, en el caso de ENVASES RÍGIDOS (bidones, botellas) haga el "triple lavado" o "lavado a presión" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforé el envase en su base para evitar su reutilización como tal. Separe las tapas de los envases para llevar por separado. Trasladar los envases al comercio que se los vendió o centro de acopio más cercano. Por más información contactarse con CAMPOLIMPIO al 29254539 o info@campolimpio.org.uy. **Instrucciones de almacenamiento:** ESTE PRODUCTO CORROE EL HIERRO, GALVANIZADOS O LATA, EMITIENDO GASES EXPLOSIVOS. NO PULVERIZAR NI GUARDAR EN DEPÓSITOS DE ESTE MATERIAL. Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

Lanafil



CUIDADO





HERBICIDA

GLYFOSOL FULL 660 SL

RECOMENDACIONES DE USO

Generalidades del producto, modo y mecanismo de acción: GLYFOSOL –FULL 660 SL es un herbicida sistémico, no selectivo, usado en post-emergencia para el control de malezas anuales y perennes, tanto de hoja ancha como gramíneas. Su modo de acción es inhibir a la enzima precursora de la formación de aminoácidos aromáticos. Se trasloca en la planta desde el punto de contacto con el follaje hacia el sistema radicular, observándose los efectos entre los 4 y 7 días o más, dependiendo de las condiciones del tiempo y del desarrollo de la planta. Los efectos visibles son un marchitamiento y amarillamiento gradual que avanza hasta transformarse en color amarronado de la parte aérea y un deterioro del sistema radicular.

Instrucciones de uso:

CULTIVOS	MALEZAS CONTROLADAS		DOSIS (L/ha)	MALEZAS CONTROLADAS		DOSIS (L/ha)
	Nombre común	Nombre científico		Nombre común	Nombre científico	
SOJA (<i>Glycine max L. var. RG</i> (Tolerante a glifosato), MAÍZ (<i>Zea mays L.</i> Tipo RG (Tolerante a Glifosato)) Filas y entrefilas: LIMÓN (<i>Citrus x limon (L.) Osbeck</i>), NARANJA (<i>Citrus sinensis (L.) Osbeck</i>), MANDARINA (<i>Citrus reticulata Blanco</i>), MANZANA (<i>Malus domestica (Suckow) Borkh.</i>), PERA (<i>Pyrus communis L.</i>), UVA (<i>Vitis vinifera L.</i>), OLIVO (<i>Olea europaea L.</i>), DURAZNO (<i>Prunus persica (L.) Batsch</i>), CIRUELA (<i>Prunus domestica L.</i>), EUCALIPTUS (<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>), EUCALIPTUS (<i>Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden</i>), BARBECHO , CEBOLLA (<i>Allium cepa L.</i>)	MALEZAS ANUALES			MALEZAS PERENNES		
	Gramilla de rastrojo	<i>Echinochloa colona</i>	1,0 a 2,0 L/ha	Gramilla brava	<i>Cynodon dactylon</i>	2,0 a 4,0 L/ha
	Yuyo colorado	<i>Amaranthus quitensis</i>		Sorgo de Alepo	<i>Sorghum halepense</i>	
	Pasto blanco	<i>Digitaria sanguinalis</i>		Pasto miel	<i>Paspalum dilatatum</i>	
	Capín	<i>Echinochloa crus-galli</i>		Gamba rusa	<i>Alternanthera phoxeroides</i>	
	Quinoa	<i>Chenopodium album</i>		Correhuela	<i>Convolvulus arvensis</i>	
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>		Cola de zorro	<i>Setaria geniculata</i>	
	Enredadera anual	<i>Polygonum convolvulus</i>		Pasto bolita	<i>Cyperus rotundus</i>	
	Sanguinaria	<i>Polygonum aviculare</i>		Capin annoni	<i>Eragrostis plana</i>	
	Pasto roseta	<i>Cenchrus echinatus</i>		Brachiaria	<i>Brachiaria platyphylla</i>	
	Raigrás anual	<i>Lolium multiflorum</i>		Cardo negro	<i>Cirsium vulgare</i>	
	Mostaza	<i>Brassica nigra</i>		Cebadilla	<i>Bromus ulmioides</i>	
Avena guacha	<i>Avena fatua</i>	Kikuyo		<i>Pennisetum clandestinum</i>		
			Llantén	<i>Plantago lanceolata</i>		

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS: No aplicar en cultivos hortícolas o viñedos menores de tres años. No aplicar si se prevén lluvias en las 6 horas posteriores a la aplicación. Debido a su rápida descomposición en el suelo, no tiene efecto pre-emergente, lo que permite implantar inmediatamente cualquier cultivo en el área tratada. En tratamiento de manchoneo se puede aplicar al 0,7 - 1 % en general y para controlar gramilla al 1.5 %. No tratar malezas que han sido recién cortadas o que sufran stress hídrico ya que se afecta la traslocación. Momento(s) de aplicación: Aplicar en postemergencia de malezas. Preferentemente en estado de desarrollo temprano de las malezas y con condiciones de humedad en el suelo, temperatura media y buena luminosidad. **MALEZAS ANUALES:** Aplicar al haber un crecimiento activo entre 4 y 6 hojas de las malezas. En malezas de mayor desarrollo usar la dosis superior. **MALEZAS PERENNES:** son más susceptibles cuando están en activo crecimiento cercano a la floración y antes de la madurez. **FRUTALES:** realizar aplicaciones dirigidas, evitando rociar tallos y hojas verdes. **CEBOLLA:** aplicar post-trasplante, realizar aplicaciones dirigidas. **Número, frecuencia, o espaciamiento de aplicaciones, si corresponde:** Una sola aplicación por temporada de cultivo. Si hubiera re-infestación por nacimiento de nuevas malezas, se deberá aplicar nuevamente. Para el control de malezas perennes puede repetirse el tratamiento cuando el crecimiento de rebrotes lo haga necesario. **CEBOLLA:** No realizar más de dos aplicaciones por ciclo de cultivo. **Modo de preparación y técnica de aplicación:** Calidad de agua: Si el agua es dura (niveles superiores a 150 ppm CaCO₃), deberá usarse un secuestrante de cationes, previo al agregado de los productos, con el fin de evitar pérdida del químico en el tanque. Esta corrección, a su vez, mejora la penetración foliar. El pH de estabilidad para herbicidas está entre 4 y 6. Medir el pH del agua, previo a agregar los productos y luego de tener pronta la mezcla. Lo importante, es el pH de la mezcla realizada. La calidad del agua queda determinada por la ausencia de suelo o materia orgánica dispersas en el agua. Hay productos que se adsorben fácilmente a estos sólidos disueltos en el agua. Eso significa la pérdida de producto biológicamente activo y, por ende, baja efectividad del mismo. **Modo de preparación:** Se coloca agua en el tanque, preferentemente, hasta el 75% con el revolovedor prendido. En mezclas se deben ir agregando los químicos de a uno, de manera que no se mezclen a altas concentraciones. **SIEMPRE SE DEBE APLICAR CON REVOLVEDOR PRENDIDO.** Tecnología de aplicación: Aplicar con equipos terrestres o aéreos. Realizar aplicaciones diurnas. El tamaño de gota mínimo requerido, es de 250 µm (micrones) de DMV. En función de las condiciones climáticas (temperatura, humedad relativa y velocidad del viento), se decidirá ese tamaño de gota o uno superior a utilizar. Se buscará eficacia máxima, sin generar deriva. El volumen de aplicación se aumentará a medida que se aumenta el tamaño de gota, para mantener coberturas similares. **Restricciones Legales para la Aplicación de Productos Fitosanitarios.** Resol. s/n de 14/5/2004 y N° 188 DE 25/3/2011. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. Resol. N°129 de 27/2/2008 -No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. **Compatibilidad y fitotoxicidad:** Es compatible con la mayoría de los herbicidas, salvo los herbicidas fenoxiacéticos y los formulados como polvos mojables. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico-químico o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo en una botella limpia. Para conocer la compatibilidad de los fitosanitarios a agregar al tanque de pulverizar, se debe hacer una prueba a pequeña escala en una botella (preferentemente de agua y no de bebida cola). Hecha la mezcla a escala, se agita y posteriormente se deja en reposo y se analiza a 1, 5, 10 y 30 minutos. Si luego de 1 minuto, la mezcla se corta, no deberá aplicarse. Si el corte está entre los 5 y 10 minutos, con agitación se puede aplicar. Si a los 30 minutos, no se cortó, se considera que la mezcla es estable. **Tiempos de espera:** Antes de realizar cualquier forma de laboreo se deben esperar 5 - 10 días luego de la aplicación para que se produzca una completa traslocación del herbicida. En cultivos tolerantes a glifosato esperar 14 días para cosecha. Para reingresar animales a pastoreo esperar 21 días. Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente, dejando transcurrir 24 horas. Otras informaciones necesarias respecto al uso: **PREVENCIÓN DE RESISTENCIA:** Se recomienda rotar o combinar con otros ingredientes activos de diferentes mecanismos de acción, para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes. Se debe observar la presencia de malezas sin controlar eliminando las malezas sobrevivientes para evitar su propagación.

Campo Limpio™
PROGRAMA DE MANEJO DE ENERDES VACÍOS



CUIDADO