



FUNGICIDA

DITHIALAN 75 WDG

USO AGRÍCOLA

Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en esta etiqueta.

Lote N°:
Fecha de fabricación:
Fecha de vencimiento: **ver envase**
Contenido neto: **1 Kg.**

Gránulos dispersables

Ingrediente activo: **Ditíanon** en peso: **75 %**

Grupo químico: **Quinona**

Fabricante: Jiangxi Heyi Chemical Co. Ltd.
País de origen: CHINA

Registro: N° 5232
Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Registrante: **Lanafil S.A.**
Bvar. Artigas 420 Of.105/Montevidео
Tel.: 2710 1932/lanafil@lanafil.com/lanafil.com

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Generalidades: DITHIALAN 75 WDG es un fungicida de amplio espectro que actúa inhibiendo las enzimas responsables de la germinación de las esporas de los hongos patógenos. Frente a la sarna del manzano y del peral tiene acción curativa hasta 48 horas después de comenzado el período de infección.

Instrucciones de uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS Alto volumen (a punto de goteo)(*)	DOSIS Alto volumen (a punto de goteo) (#)
	Nombre Común	Nombre Científico		
Manzano (<i>Malus domestica</i>). Peral (<i>Pyrus communis</i>).	Sarna	<i>Venturia inaequalis</i> <i>Venturia pyrina</i>	50 a 80 g / 100 L agua	50 a 80 g/100 L
CÍTRICOS: Limonero (<i>Citrus x limon</i> (L) Osbeck), Mandarino (<i>Citrus reticulata</i> Blanco), Naranja (<i>Citrus sinensis</i> (L) Osbeck), Pomelo (<i>Citrus grandis</i> L. Osbeck)	Sarna	<i>Sphaceloma fawcetti</i>	90 g / 100 L agua	90 g/100L
Duraznero (<i>Prunus persicae</i>)	Podredumbre parda	<i>Monilinia fructicola</i>	70-100 g/100 L agua	70-100 g/100 L

(#) Cuando se utilicen equipos que arrojen menores volúmenes de agua por hectárea, se deberá ajustar la dosis en forma proporcional a la reducción de agua por ha, manteniendo siempre la misma cantidad de producto por ha.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Clasificación Toxicológica: CLASE II (DOS) MODERADAMENTE PELIGROSO, IPCS/OMS 2009. **Antídotos:** No tiene antídoto. **Primeros auxilios:** En caso de ingestión: NO provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos: lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado. **Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:** Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. **Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:** Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. **Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:** Producto moderadamente tóxico para aves, muy tóxico para peces y poco tóxico para abejas. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosos para peces. En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en envases adecuados, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. **Disposición final de envases:** Una vez vaciado el contenido del envase perfórelo para evitar su reutilización. **Instrucciones de almacenamiento:** Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado ☠ Veneno".

RECOMENDACIONES DE USO

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: DITHIALAN 75 WDG es un fungicida de amplio espectro que actúa inhibiendo las enzimas responsables de la germinación de las esporas de los hongos patógenos. Frente a la sarna del manzano y del peral tiene acción curativa hasta 48 horas después de comenzado el período de infección. **Número, frecuencia, o espaciamiento de aplicaciones:** Momento, número y frecuencia de aplicación: En manzanos y perales, tratamientos preventivos a partir del estado de "punta verde" y cuando se den las condiciones predisponentes para la infección de la enfermedad. Para efectos curativos, aplicar dentro de las 48 horas de infección. Cítricos: aplicar en el estado fenológico de "botón floral" y "caída de pétalos. Durazneros: aplicar preventivamente cuando se den condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad; en floración y maduración de frutos.

Compatibilidad y fitotoxicidad: No compatible con aceites. Puede ser mezclado con la mayoría de los productos autorizados en los cultivos indicados, salvo los de reacción fuertemente alcalina. No aplicar conjuntamente con aceites emulsionables. Dejar transcurrir una semana antes y/o después de la aplicación de DITHIALAN 75 WDG. En caso de duda, realizar una prueba previa a pequeña escala para probar su compatibilidad con otro fitosanitario, como así mismo su fitocompatibilidad. Observar las recomendaciones de la etiqueta del producto con el cual se combine. Si dichas recomendaciones se contradicen con las establecidas en esta etiqueta, no efectuar la mezcla. **Tiempo de espera:** Manzano, Peral, Duraznero: 21 días. Cítricos: 30 días. **Tiempo de reingreso al cultivo:** No ingresar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas. Otras informaciones NECESARIAS respecto al uso. Cuando fungicidas de un mismo modo de acción, son usados repetidamente en las mismas zonas, puede producirse la aparición de biotipos resistentes, que logran sobrevivir, propagarse y/o volverse dominantes en dicha zona. Se recomienda el uso de fungicidas con diferente modo de acción en forma alternada o en mezcla, evitan o demoran el desarrollo de la resistencia. **Modo de preparación y técnica de aplicación:** Es conveniente hacer una pre-dilución de la cantidad calculada de DITHIALAN 75 WDG en un balde con algo de agua, revolviendo hasta consistencia cremosa. Llenar el tanque del equipo de aplicación con agua hasta la mitad de su capacidad. Con el sistema de agitación en funcionamiento, agregar lentamente la pre-dilución y completar el volumen de agua necesario. Puede aplicarse con pulverizadores terrestres, tanto de alto volumen como de bajo volumen, asegurándose que logren una buena cobertura del cultivo a tratar. Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos. Prohibido aplicar con máquinas terrestres autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 m de cualquier corriente natural de agua o fuentes artificiales. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

Lanafil



NOCIVO

